

POLGÁRDI POLGÁRMESTERI HIVATAL JEGYZŐJE

POLGÁRDI, Batthyány u. 132.

Telefon/Fax: 22/576-230

jegyzo@polgardi.hu

Ügyiratszám: Ált-2333-2/2018.

Tárgy: tájékoztatás

Ügyintéző: Májer Alexandra


Tisztelt Lakosság!


A Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály 2018. június 13. napján érkezett levelében tájékoztatta hatóságomat neonikotinoid típusú csávázószerrel kezelt kultúrák vetésbejelentésével kapcsolatban.

Fent nevezett hatóság tájékoztató levele ezen irat mellékleteként megtalálható.

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásul vételét.

Polgárdi, 2018. június 21.


Dr. Zaccaria Beáta Lea
jegyző



POLGÁRMESTERI HIVATAL		
BEJELZETT: 2018 JÚN 13.		
szám:		mell.
Előadó:	Előzetes:	Utószám:

Melléklet:

***Tájékoztatás a bejelentett letelepedési hely körüli röpkörzetben található,
neonikotinoid típusú csávázószerrel kezelt növényzetről***

Tisztelt Méhészek!

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) szükséghelyzeti engedélyeket adott ki a Cruiser OSR 322 FS, Cruiser 350 FS, Poncho 600 FS, Ellado, Nuprid 600 FS Red rovarölő csávázószerre repce, kukorica és napraforgó vetőmag csávázására és vetésére. A kiadott szükséghelyzeti engedélyek az idei szezonban az említett kultúrák jelentős területi hányadát érintik.

Az említett készítményekkel történő csávázás a jelenlegi tudományos eredmények ismeretében nem jelent elfogadhatatlan kockázatot a méhek számára, ha a méhcsaládok kedvező egészségügyi állapotban vannak és a kezelt kultúráknál a méhek röpkörzetén belül folyó növényvédelmi tevékenység során a kezelések az engedélyokiratokban foglalt utasítások szigorú betartása szerint valósulnak meg.

Ugyanakkor el kell ismerni, hogy a vizsgálatok során a méhekre ártalmatlan tulajdonságot sem sikerült igazolni. A neonikotinoidok használatának másfél évtizedes magyarországi tapasztalatai alapján a repce, napraforgó és kukorica csávázása szabályszerű felhasználás esetén nem okozott kimutatható károsodást a méhekre. Sőt, a csávázott kultúrák esetében kisebb a valószínűsége és gyakorisága méhekre kockázatos permetezőszerek használatának.

A fentiek mérlegelésével a méhészek dönthetnek, hogy a csávázószerrel kezelt virágzó állományokban a méhek letelepítésével vagy távoltartásával kívánják folytatni az évi méhészeti tevékenységüket.

jegyző